ENGLISH

Instructions for Use
Angiographic Catheter

Contents:
Angiographic Catheter

Device description
The Angiographic Catheter is a braided intravascular catheter designed to deliver contrast medium into selected blood vessels during an angiographic procedure to facilitate the visualization of the vascular system of a target area. Angiographic catheters are available in various diameters and lengths, and with various tip-shape configurations. For details regarding catheter dimensions, tip-shape, guidewire compatibility and maximum injection pressure refer to the product labels.

Indications
Angiographic catheters are designed to deliver radiopaque contrast medium to selected sites in the vascular system.

Contraindications
None known.

Warnings
- Refer to the symbol section of the Instructions for Use.
- Do not use the product when the "use by" date specified on the label has expired.
- Catheters are supplied nonpyrogenic and sterile using an ethylene oxide (EO) sterilization method. Do not use the catheter if its sterile barrier and/or packaging is compromised.
- Catheters are for single-procedure-use only. Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse, reprocessing or resterilization may compromise the structural integrity of the catheter and/or lead to product failure which, in turn, may result in patient injury, illness or death. Catheters are extremely difficult to clean after exposure to biological materials. Reuse, reprocessing or resterilization may create a risk of contamination of the catheter and/or cause patient infection or cross-infection, including, but not limited to, the transmission of infectious disease(s) from one patient to another. Contamination of the catheter may lead to injury, illness or death of the patient.
- Inspect the catheter before use to verify that its size, shape and condition are suitable for the specific procedure. Do not use damaged catheters.
- Before and during use, flush the catheter with sterile heparinized saline solution to prevent or reduce blood clotting and air embolism. Use of systemic heparinization should be considered. In case of multiple use within the same procedure make sure the catheter is flushed and cleaned on the outside.
- Do not expose to organic solvents.
- Do not exceed the maximum injection pressure indicated on the label.
- Following use, a catheter may pose a biological hazard. Handling, disposal and destruction of used catheter and its packaging should be performed in accordance with applicable laws and regulations and following adequate processes.

Precautions
- Indications, contraindications and use of this catheter should always consider actual medical insights and standards. The patient's suitability for use of the product should be considered.
- Administration of pre-, intra- and postoperative medication should be performed according to actual medical standards.
- To avoid catheter tip damage at unpacking, take the catheter at the hub and lift out gently. Always handle the catheter with utmost care. Careless handling at unpacking or during preparation can affect product performance.
- In order to avoid catheter damage and blood vessel damage, introduce, advance, and withdraw the catheter through a catheter sheath introducer and over a pre-positioned guidewire.
- When inserting a catheter with a pigtail tip-shape over a guidewire that is positioned in the patient, the pigtail tip should be straightened carefully only with a tip-straightener to avoid tip damage. Do not straighten by hand.
- Take extreme care to avoid damage to the vascular system through which the catheter passes. The catheter may occlude smaller vessels. Care must be taken to avoid complete blood flow blockage.
- Advancement, manipulation and withdrawal of the catheter should always be performed under fluoroscopic guidance.
- Should the catheter shaft become severely kinked, withdraw the entire system (angiographic catheter, guidewire and catheter sheath introducer). Excessive torquing could damage the catheter, leading to possible catheter breakage.
- If strong resistance is encountered during manipulation, discontinue the procedure and determine the cause of the resistance before proceeding. If the cause of the resistance cannot be determined, withdraw the catheter. Simultaneous retraction of all used devices can be considered.
- Withdrawing the catheter from the vasculature and/or guidewire from catheter lumen should be carried out with utmost care.

Complications
Use of this product in clinical procedures should be restricted to those physicians who have had relevant and adequate training and are familiar with the conceivable complications that may occur at any time during or after the procedure. Possible complications include, but are not limited to the following:
- Arrhythmia
- Bleeding complications
- Death
- (Air) Embolism
- Hematoma at the puncture site
- Haemorrhage
- Infection
- Myocardial ischemia and/or infarction
- Neurological Deficit including Transient Ischemic Attack / Stroke
- Plaque migration
- Pseudoaneurysm
- Thrombus formation
- Vessel trauma including dissection, perforation and / or rupture
- Vessel occlusion
- Vessel spasm

Directions for Use
- Carefully take the catheter from its packaging.
- Flush the catheter with sterile heparinized saline solution.
- Introduce the catheter into the vasculature over an indwelling guidewire using a percutaneous entry technique of choice and carefully advance the catheter to the desired location under fluoroscopic control.
- After removing the guidewire, angiography can be performed.
- For catheter removal, reinsertion of the guidewire is recommended. Carefully withdraw the catheter under fluoroscopic control.

Disclaimer of Warranty and Limitation of Remedy
PendraCare International B.V. has exercised reasonable care in the manufacture of this product.
There is no express or implied warranty, including without limitation any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, on the PendraCare product described in this publication. Under no circumstances shall PendraCare be liable for any direct, incidental or consequential damages other than as expressly provided by specific law. No person has the authority to bind PendraCare to any representation or warranty except as specifically set forth herein.

Descriptions or specifications in PendraCare printed matter, including this publication, are meant solely to generally describe the product at the time of manufacture and do not constitute any express warranties.

PendraCare International B.V. will not be responsible for any direct, incidental or consequential damages resulting from reuse of the catheter.

NEDERLANDS

Gebruiksaanwijzing
Angiografiekatheter

Inhoud:
Angiografiekatheter

Beschrijving instrument
De angiografiekatheter is een gevlochten, intravasculaire katheter voor het toedienen van contrastvloeistof in bepaalde bloedvaten tijdens angiografie om een bepaald doelgebied in het vaatsysteem zichtbaar te maken. Angiografiekatheters zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en lengtes en met verschillende tipvormen. Voor informatie over de afmetingen, tipvorm, geleidedraad en max. inspuitdruk van de katheter zie de productlabels.

Indicaties
Angiografiekatheters zijn ontwikkeld voor het toedienen van niet-straalngsdoorlatende contrastvloeistof aan bepaalde delen van het vaatsysteem.

Contra-indicaties
Niet bekend.

Waarschuwingen
- Zie het hoofdstuk Symbolen in de Gebruiksaanwijzingen.
- Gebruik het product niet als de uiterste gebruiksdatum aangegeven op het label is verstreken.
- De katheters worden niet-pyrogeen en steriel (met ethyleenoxide (EO) gesteriliseerd) geleverd. Gebruik de katheter niet als de steriele barrière en/of verpakking is beschadigd.
- De katheters zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken, opnieuw verwerken of opnieuw steriliseren. Hergebruik, opnieuw verwerken of opnieuw steriliseren kan de integriteit van de katheter teniet doen en/of leiden tot storingen die op hun beurt kunnen leiden tot letsel, ziekte of overlijden. Katheters zijn zeer moeilijk te reinigen na blootstelling aan biologische materialen. Hergebruik, opnieuw verwerken of opnieuw steriliseren kan tot besmetting van de katheter en/of daaropvolgende infectie of kruisinfectie leiden, waaronder, maar niet beperkt tot, de overdracht van infectieziekte(n) tussen patiënten onderling. Besmetting van de katheter kan tot letsel, ziekte of overlijden van de patiënt leiden.
- Controleer de katheter vóór gebruik op de juiste maat, vorm en conditie voor de specifieke ingreep. Gebruik geen beschadigde katheters.
- Spoel de katheter voor en tijdens gebruik met een steriele heparine-zoutoplossing om bloedstolsels en luchtembolieën te voorkomen. Het gebruik van systemische heparine dient te worden overwogen. Bij meervoudig gebruik tijdens dezelfde ingreep dient erop te worden toegezien dat de katheter wordt gespoeld en aan de buitenkant wordt schoongemaakt.
- Niet blootstellen aan organische oplosmiddelen.
- Max. inspuitdruk (zie label) niet overschrijden.
- De katheter kan na gebruik een biologisch gevaar inhouden. Het hanteren, afvoeren en vernietigen van de gebruikte katheter en verpakking dient overeenkomstig geldende wet- en regelgeving en conform adequate processen te geschieden.

Voorzorgsmaatregelen
- Bij indicaties, contra-indicaties en gebruik van deze katheter dienen altijd de actuele medische inzichten en standaarden te worden gevolgd. De geschiktheid van de patiënt voor het gebruik van dit product dient te worden bekeken.
- Toediening van pre-, intra- en postoperatieve medicatie dient te geschieden conform de actuele medische standaarden.
- Om beschadiging van de katheterpunt bij het uitpakken te voorkomen, dient de katheter voorzichtig aan de koppeling uit de verpakking te worden gehaald. Behandel de katheter altijd met de grootst mogelijke zorg. Onvoorzichtig hanteren bij het uitpakken of tijdens het prepareren kan de prestaties van het product beïnvloeden.
- Om beschadiging van de katheter en bloedvaten te voorkomen, dient de katheter met behulp van een introductiesysteem en over een vooraf geplaatste geleidedraad te worden opgebracht, opgevoerd en teruggetrokken.
- Als een Pigtail-katheter over een geleidedraad wordt ingebracht, dient de tip van de Pigtail-katheter voorzichtig met een zgn. tip-straightener te worden rechtgetrokken om beschadiging van de tip te voorkomen. Niet met de hand strekken.
- Wees zeer voorzichtig om beschadiging van het door de katheter gepasseerde vaatstelsel te voorkomen. De katheter kan kleinere vaten blokkeren. Let op dat de bloedstroom niet wordt geblokkeerd.
- Het opvoeren, manipuleren en terugtrekken van de katheter dient altijd met behulp van fluoroscopie te geschieden.
- Als de katheterschacht ernstig knikt, dient het complete systeem (d.w.z. geleidekatheter, geleidedraad en introducteursysteem) te worden teruggetrokken. Overmatige torsie kan de katheter beschadigen en kan ertoe leiden dat de katheter breekt.
- Als bij het manipuleren veel weerstand optreedt, dient de procedure te worden afgebroken en de oorzaak voor de weerstand te worden bepaald, voordat de ingreep wordt voortgezet. Als de oorzaak voor de weerstand niet kan worden bepaald, dient de katheter te worden teruggetrokken. Gelijktijdige terugtrekking van alle gebruikte medische hulpmiddelen dient te worden overwogen.
- Het terugtrekken van de katheter uit het vaatstelsel en/of de geleidedraad van het katheterlumen dient met de grootst mogelijke voorzichtigheid te geschieden.

Complicaties
Gebruik van dit product in klinische ingrepen dient voorbehouden te zijn aan artsen met een relevante en adequate training, die bekend zijn met eventuele complicaties die te allen tijde kunnen optreden tijdens of na de ingreep. Als mogelijke complicaties kunnen onder andere, maar niet alleen worden genoemd:
- Aritmie
- Bloedingscomplicaties
- Dood
- (Lucht)embolieën
- Hematoma bij het inbrengpunt
- Bloeding
- Infectie
- Myocardiale(a)(ie) ischemie en/of infarct
- Neurologische afwijkingen waaronder Transient Ischemic Attack (voorbijgaande ischemische aanval)/stroke
- Migratie van plaque
- Vals aneurysma
- Trombi
- Weefsechaading waaronder dissectie, perforatie en/of ruptuur
- Vaatafsluiting
- Vaatspasme

Gebruiksaanwijzing
- Pak de katheter voorzichtig uit de verpakking.
- Spoel de katheter met steriele heparine-zout oplossing.
- Breng de katheter percutaan over een permanente geleidedraad in het vaatstelsel in en voer de katheter onder fluoroscopische doorlichting voorzichtig op naar de gewenste locatie.
- Na verwijdering van de geleidedraad kan met de angiografie worden begonnen.
- Voordat de katheter wordt teruggetrokken, dient de geleidedraad weer te worden geplaatst. Trek onder fluoroscopische doorlichting de katheter voorzichtig terug.

Afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid
PendraCare International B.V. heeft bij de productie van dit instrument een redelijke mate van zorgvuldigheid in acht genomen.
Er wordt met betrekking tot het in deze publicatie beschreven PendraCare-product geen uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende garantie verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige stilzwijgende garanties ten aanzien van verkoopbaarheid dan wel geschiktheid voor een bepaald doel. PendraCare is onder geen beding aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele of gevolgschade, tenzij de wet dit nadrukkelijk voorschrijft. Behoudens de in dit document specifiek aangegeven gevallen is niemand gerechtigd om PendraCare te houden aan enige garantie dan wel toezegging.

Beschrijvingen of specificaties in het drukwerk van PendraCare, waaronder deze publicatie, zijn uitsluitend bedoeld als algemene beschrijving van het product op het moment van productie en vormen geenszins een garantie in welke vorm dan ook.

PendraCare International B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade, bijkomstige schade of gevolgschade tengevolge van hergebruik van de katheter.

DEUTSCH

Gebrauchsinformationen
Angiographiekatheter

Inhalt
Angiographiekatheter

Gerätebeschreibung
Der Angiographiekatheter ist ein gewebter intravaskulärer Katheter, der für die Einbringung von Kontrastmittel in bestimmte Blutgefäße bestimmt ist, um die Visualisierung des Venensystems in einem Zielbereich bei angiographischen Untersuchungen zu vereinfachen. Angiographiekatheter sind in verschiedenen Durchmessern und Längen und mit unterschiedlichen Spitzenkonfigurationen erhältlich. Einzelheiten bezüglich Katheterabmessungen, Spitzenform, Führungsdrahtkompatibilität und maximalem Injektionsdruck sind den jeweiligen Produktetiketten zu entnehmen.

Indikationen
Angiographiekatheter sind für die Einbringung von strahlenundurchlässigem Kontrastmittel in ausgewählte Bereiche des Venensystems bestimmt.

Kontraindikationen
Keine bekannt.

Warnhinweise
- Nehmen Sie in der Gebrauchsanweisung Bezug auf den Bereich mit den Symbolen.
- Das Produkt nach Ablauf des auf dem Etikett angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.
- Die Katheter werden mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert und steril und nichtpyrogen geliefert. Der Katheter sollte nicht verwendet werden, wenn dessen Sterilität nicht mehr gewährleistet oder seine Verpackung beschädigt ist.
- Die Katheter sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden, wiederaufbereiten oder resterilisieren. Durch Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisierung kann die strukturelle Unversehrtheit des Katheters beeinträchtigt werden und/oder ein Defekt verursacht werden, der wiederum zu Verletzung, Krankheit oder Tod eines Patienten führen kann. Katheter sind nach dem Kontakt mit biologischem Material extrem schwierig zu reinigen. Die Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisierung kann das Risiko einer Kontamination des Katheters mit sich bringen und/oder zu einer Infektion oder Kreuzinfektion des Patienten führen, u. a. der Übertragung einer (von) Infektionskrankheit(en) von einem Patienten zu einem anderen. Die Kontamination des Katheters kann zu Verletzung, Krankheit oder Tod des Patienten führen.
- Vor Verwendung ist der Katheter zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Größe, Form und Zustand für den betreffenden Eingriff geeignet sind. Beschädigte Katheter dürfen nicht verwendet werden.
- Vor und während der Anwendung ist der Katheter mit einer sterilen heparinisierten Kochsalzlösung zu spülen, um Blutgerinnung und Luftembolien zu vermeiden oder zu verringern. Systemische Heparinisierung ist zu erwägen. Wird derselbe Katheter bei einer Untersuchung mehrfach verwendet, ist dieser sorgfältig zu spülen und von außen zu reinigen.
- Den Katheter nicht mit organischen Lösungsmitteln in Verbindung bringen.
- Der auf dem Etikett angegebene maximale Injektionsdruck darf nicht überschritten werden.
- Nach der Verwendung können Katheter eine biologische Gefahr darstellen. Die Handhabung, Entsorgung und Vernichtung von gebrauchten Produkten und ihrer Verpackungen sollte gemäß den geltenden Gesetzen und Richtlinien und den adäquaten Vorgängen entsprechend durchgeführt werden.

Hinweise
- Indikationen, Kontraindikationen und Anwendung dieses Katheters sollten immer nach aktuellen medizinischem Standard und Wissen erfolgen. Der Patient muss für den Einsatz des Produkts geeignet sein.
- Die Einleitung der prä-, intra- und post-operativen Medikation sollte nach aktuellen medizinischen Standard erfolgen.
- Zur Vermeidung von Beschädigungen der Katheterspitze, den Katheter beim Auspacken am Anschluss anfassen und vorsichtig herausheben. Den Katheter immer mit größtmöglicher Sorgfalt behandeln. Durch unvorsichtige Handhabung beim Auspacken oder bei der Vorbereitung kann die Leistungsfähigkeit des Produktes beeinträchtigt werden.
- Damit der Katheter beim Einführen nicht knicken und ein Blutgefäß beschädigen kann, sollte er zuvor über einen Katheter-Einführschaft und einen bereits positionierten Führungsdraht eingeführt und wieder zurückgezogen werden.
- Bei Einführung einer geringelten Katheterspitze über einen beim Patienten angebrachten Führungsdraht darf die Spitze lediglich vorsichtig mit einem speziell dafür vorgesehenen Instrument ausgerichtet werden, um Beschädigungen der Katheterspitze zu vermeiden. Die Spitze darf nicht von Hand ausgerollt werden.
- Um eine Beschädigung der Blutgefäße, durch die der Katheter geführt wird, zu vermeiden, ist äußerste Sorgfalt walten zu lassen. Der Katheter kann jedoch kleinere Blutgefäße verstopfen. Vorsicht ist geboten, um eine komplette Blockade des Blutflusses zu vermeiden.
- Das Einführen, die Manipulation und das Rückziehen des Katheters sollte immer unter einer Röntgenprüfung erfolgen.
- Sollte der Katheterschaft stark geknickt werden, ist das gesamte System (Führungskatheter, Führungsdraht und Katheter-Einführschaft) zurückzuziehen. Ein übermäßiges Torquieren könnte den Katheter beschädigen und so möglicherweise zu einem Katheterbruch führen.
- Wenn während des Eingriffs ein starker Widerstand bzw. ein Hindernis zu spüren ist, brechen Sie den Eingriff ab und stellen Sie, bevor Sie fortfahren, die Ursache für den Widerstand fest. Wenn der Grund für den Widerstand nicht bestimmt werden kann, ist der Katheter zurückzuziehen. Ein gleichzeitiges Rückziehen aller verwendeten Geräte kann in Erwägung gezogen werden.
- Beim Rückziehen des Katheters aus den Blutgefäßen und/oder des Führungsdrahtes vom Katheter-Lumen sollte mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden.

Komplikationen
Eingriffe mit diesem Produkt dürfen nur von Ärzten mit entsprechender Ausbildung durchgeführt werden, die mit den möglichen Komplikationen, die während oder nach dem Eingriff auftreten können, vertraut sind.
Zu den möglichen Komplikationen zählen u. a.:
- Rhythmusstörungen
- Komplikationen durch Blutungen
- Tod
- (Luft-) Embolien
- Hämatome an der Punktionsstelle
- Hämorrhagie
- Infektionen
- Herzinfarkt oder Myokardischämie
- Neurologische Ausfälle einschließlich transitorische ischämische Attacke / Schlaganfall
- Plaqueablösung
- Pseudo-Aneurysma
- Thrombusformation
- Verletzungen an Blutgefäßen einschließlich Dissektionen, Perforationen und/oder Rupturen
- Verschluss von Blutgefäßen
- Gefäßkrämpfe

Gebrauchsanweisung
- Den Katheter vorsichtig aus der Verpackung nehmen.
- Den Katheter einer sterilen heparinisierten Kochsalzlösung spülen.
- Den Katheter unter Anwendung einer perkutanen Einführtechnik über einen verbliebenden Führungsdraht in das Blutgefäß einbringen und vorsichtig unter röntgenoskopischer Sicht bis in den Zielbereich schieben.
- Nach Entfernung des Führungsdrahtes kann eine Angiographie durchgeführt werden.
- Zur Entfernung des Katheters wird die erneute Einführung des Führungsdrahtes empfohlen. Den Katheter unter röntgenologischer Sicht vorsichtig entfernen.

Garantieerklärung und Haftungsbeschränkung
PendraCare International B.V. hat bei der Herstellung dieses Produkts größtmögliche Sorgfalt walten lassen.
Für das in dieser Anleitung beschriebene Produkt wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie abgegeben, dies bezieht sich u. a. auf die stillschweigende Garantie zur Marktgängigkeit oder die Eignung für einen speziellen Zweck. Unter keinen Umständen kann PendraCare für irgendeinen direkten, unvorhergesehenen oder Folgeschaden haftbar gemacht werden, ausgenommen davon sind Schäden, die ausdrücklich in einem bestimmten Gesetz vorgesehen sind. Keine Person hat die Befugnis, PendraCare an ein Recht oder eine Garantie zu binden, sofern nicht ausdrücklich hierin darauf hingewiesen wird.

Gedruckte Beschreibungen oder Spezifikationen von PendraCare, einschließlich dieses Schriftstücks, dienen einzig und allein der allgemeinen Beschreibung des Produkts zum Zeitpunkt der Herstellung und stellen keine ausdrückliche Garantieerklärung dar.

PendraCare International B.V. ist nicht verantwortlich für irgendwelche direkten, unvorhergesehenen oder Folgeschäden, die sich aus der Wiederverwendung des Katheters ergeben.

FRANÇAIS

Consignes d'utilisation
Cathéter angiographique

Contient :
Un cathéter angiographique

Description de l'appareil
Le cathéter angiographique est un cathéter intravasculaire à tube tressé conçu pour injecter un produit de contraste dans des vaisseaux sanguins sélectionnés pendant un examen angiographique destiné à faciliter l'observation du système vasculaire ou d'une zone cible. Les cathéters angiographiques sont disponibles en différents diamètres et longueurs et avec différentes formes d'embouts. Pour de plus amples informations concernant les dimensions du cathéter, la forme d'embout, la compatibilité du guide et la pression d'injection maximale, consulter les étiquettes de produit.

Indications
Les cathéters angiographiques sont conçus pour injecter un produit de contraste opaque aux rayons X dans des zones sélectionnées du système vasculaire.

Contre-indications
Aucune contre-indication connue.

Avertissements
- Consulter la partie des symboles dans le mode d'emploi.
- Ne jamais utiliser le produit si la date limite d'utilisation figurant sur l'étiquette a expiré.
- Les cathéters sont fournis non pyrogéniques et stérilisés par traitement à l'oxyde d'éthylène (OE). Ne jamais utiliser ce produit si l'emballage ou la barrière stérile du produit est endommagé(e).
- Les cathéters sont prévus pour l'usage unique et seul patient. Ne jamais réutiliser, retraiter ou restériliser. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation peut nuire à l'intégrité structurelle du cathéter et/ou engendrer une défaillance de l'instrument susceptible de provoquer des blessures, une maladie, voire la mort du patient. Les cathéters sont extrêmement difficiles à stériliser après leur contact avec des matières biologiques. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation engendre un risque de contamination du cathéter et/ou peut provoquer une infection ou une infection croisée chez le patient, y compris entre autres, la transmission de maladie(s) contagieuse(s) d'un patient à un autre. La contamination du cathéter peut provoquer des blessures, une maladie, voire la mort du patient.
- Vérifier le cathéter avant l'usage pour vous assurer que la taille, la forme et l'état sont adaptés à l'intervention spécifique. Ne jamais utiliser de cathéters endommagés.
- Avant et pendant l'utilisation, rincer le cathéter avec une solution saline héparinisée stérile pour prévenir et/ou réduire la coagulation sanguine et l'embolie gazeuse. L'utilisation d'une héparinisation systémique peut être envisagée. En cas d'utilisation multiple avec la même procédure, s'assurer que le cathéter est rincé et propre à l'extérieur.
- Ne pas exposer à des solvants organiques.
- Ne jamais dépasser la pression d'injection maximale mentionnée sur l'étiquette.
- Après usage, un cathéter peut présenter des risques biologiques. La manipulation, la mise au rebut et la destruction de cathéters usagés et de leurs emballages doivent être réalisées conformément aux lois et réglementations en vigueur et en suivant les processus adéquats.

Précautions
- Les décisions concernant les indications, les contre-indications et l'utilisation de ce cathéter doivent impérativement tenir compte des connaissances et des normes médicales actuelles. Il faut également vérifier si le patient est apte à subir l'utilisation de ce produit.
- L'administration de médicaments avant, pendant et après l'opération doit suivre les pratiques et les normes médicales en vigueur.
- Pour éviter d'endommager le cathéter en le sortant de son emballage, il convient de le tenir au niveau de l'embout Luer et de le soulever délicatement. Manipuler ce produit avec le plus grand soin. L'absence de précaution lors du déballage et/ou de la préparation de ce produit risque de nuire à son efficacité.
- Pour éviter la plicature du cathéter et minimiser le risque de lésions vasculaires, utiliser un introducteur et un guide pré-positionné lors de l'introduction, de la progression et du retrait du cathéter.
- Lors de l'insertion d'un cathéter avec un embout en forme de queue de cochon sur un guide posé sur le patient, l'embout doit être redressé avec précaution et uniquement en utilisant un redresseur d'embout afin de prévenir l'endommagement de l'embout. Ne jamais redresser l'embout à la main.
- Faire extrêmement attention de ne pas endommager le vaisseau dans lequel le cathéter est introduit. Le cathéter peut occlure les petits vaisseaux. Faire très attention de ne pas provoquer l'occlusion du vaisseau sanguin.
- Il est recommandé de recourir à un guidage fluoroscopique lors de l'avance, la manipulation et le retrait du cathéter.
- Si la gaine de cathéter se plie dangereusement, retirer le système en entier (le cathéter angiographique, le guide et l'introducteur). Un pli excessif risque d'endommager le cathéter et de provoquer une rupture du cathéter.
- En cas de résistance/difficulté forte au cours de la manipulation, interrompre la procédure et déterminer la cause de cette résistance avant de poursuivre. Si la cause de la résistance ne peut pas être déterminée, retirer le cathéter. Le retrait simultané de tous les dispositifs utilisés peut être envisagé.
- Le retrait du cathéter du vaisseau et/ou du guide de la lumière du cathéter doit être effectué délicatement et avec le plus grand soin.

Complications possibles
L'utilisation de ce genre de produit dans une procédure clinique est réservée aux médecins dûment formés et conscients des complications pouvant survenir à tout moment aussi bien au cours qu'après l'intervention.
Les complications possibles sont les suivantes (sans que la liste ne soit exhaustive) :
- Arythmie
- Complications hémorragiques
- Décès
- Embolie (gazeuse)
- Hématomes au niveau du site de ponction
- Hémorragie
- Infection
- Infarctus et/ou ischémie myocardique
- Troubles neurologiques, y compris attaque ischémique transitoire
- Migration de plaque
- Pseudo-anévrisme
- Formation de thrombus
- Traumatisme vasculaire y compris, dissection, perforation et/ou rupture
- Occlusion vasculaire
- Spasme vasculaire

Consignes d'utilisation
- Sortir le cathéter de son emballage avec précaution.
- Rincer le cathéter avec une solution saline héparinisée stérile.
- Introduire le cathéter dans le vaisseau sur un guide à demeure en utilisant la technique d'introduction percutanée souhaitée et avancer le cathéter sous contrôle fluoroscopique jusqu'au point souhaité.
- Après dépose du guide, procéder à l'angiographie.
- Pour déposer le cathéter, il est recommandé de réinsérer le guide de cathéter. Retirer avec précaution le cathéter sous contrôle fluoroscopique.

Clauses de garantie et limites de responsabilité
PendraCare International B.V. a apporté le plus grand soin au cours de la fabrication du présent dispositif.
Aucune garantie expresse ou implicite, y compris, mais sans y être limitée, une garantie implicite quelconque concernant la valeur commerciale ou l'adéquation à un usage particulier n'est accordée sur le produit PendraCare décrit dans cette publication. PendraCare ne saurait en aucun cas être tenu responsable d'un dommage quelconque direct, indirect ou apparaissant ultérieurement, autre que ceux expressément prévus par une législation spécifique. Aucun tiers n'est autorisé à contraindre PendraCare à remettre une représentation ou une garantie quelconque à l'exception de celle exposée dans la présente publication.

Les descriptions ou les spécifications contenues dans les publications PendraCare ne sont données qu'à titre d'information sur le produit, elles représentent uniquement une description générale de ce dernier au moment de sa fabrication et ne constituent aucune garantie expresse.

PendraCare International B.V. ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage direct, indirect ou apparaissant ultérieurement, provoqué par la réutilisation du cathéter.

ESPAÑOL

Instrucciones de uso
Catéter angiográfico

Contenido:
Catéter angiográfico

Descripción del dispositivo
El catéter angiográfico es un catéter intravascular trenzado, diseñado para suministrar un medio de contraste a vasos sanguíneos seleccionados durante una intervención angiográfica para facilitar la visualización del sistema vascular de un área objetivo. Los catéteres angiográficos están disponibles en diversos diámetros y longitudes, y con configuraciones de distintas formas de punta. Consulte más información sobre las dimensiones del catéter, la forma de las puntas, la compatibilidad de los cables guía y la máxima presión de inyección en las etiquetas del producto.

Indicaciones
Los catéteres angiográficos son dispositivos estériles y apirógenos. Los catéteres están diseñados para suministrar medios de contraste radiopacos en zonas seleccionadas del sistema vascular.

Contraindicaciones
No se conoce ninguna.

Advertencias
- Consulte la sección de símbolos en las Instrucciones de uso.
- No use el producto una vez superada la fecha "usar antes de" que se indica en la etiqueta.
- Los catéteres se suministran no pirógenos y estériles con un método de esterilización de óxido de etileno (EO). No use el catéter si su barrera estéril y/o su envase han sido manipulados.
- Los catéteres son de un solo uso. No debe reutilizarlos, reprocesarlos ni resterilizarlos. La reutilización, el reprocesamiento o la resterilización pueden dañar la integridad estructural del catéter y/o provocar el fallo del producto que, a su vez, puede provocar lesiones, enfermedades o la muerte del paciente. Los catéteres resultan extremadamente difíciles de limpiar tras exponerlos a materiales biológicos. Su reutilización, reprocesamiento o resterilización puede crear un riesgo de contaminación del catéter y/o causar la infección o la infección cruzada de pacientes, incluyendo, entre otros casos, la transmisión de enfermedades infecciosas de un paciente a otro. La contaminación del catéter puede provocar lesiones, enfermedades o la muerte del paciente.
- Inspeccione el catéter antes de usarlo para comprobar que el tamaño, la forma y la condición sean adecuados para el procedimiento específico. No utilice catéteres dañados.
- Antes y durante su uso, enjuague el catéter con una solución salina heparinizada estéril para evitar o reducir los coágulos de sangre y las embolias aéreas. Debe plantearse el uso de una heparinización sistémica. En caso de uso múltiple en la misma intervención, asegúrese de enjuagar y limpiar el exterior del catéter.
- No exponga el producto a disolventes orgánicos.
- No supere la presión de inyección máxima indicada en la etiqueta.
- Una vez usado, un catéter puede constituir un riesgo biológico. La manipulación, la eliminación y la destrucción del catéter usado y de su envase deben llevarse a cabo de conformidad con la legislación y las normativas aplicables, de acuerdo con unos procesos adecuados.

Precauciones
- Las indicaciones, contraindicaciones y la utilización de este catéter siempre deben tener en cuenta las opiniones y normas médicas. Debe tenerse en cuenta la idoneidad del paciente para el uso del producto.
- La administración de medicamento prima, durante e dopo la proceduras, deve seguire gli standard attuali di trattamento.
- Per evitare danni durante l'apertura, estrarre al momento della rimozione dalla confezione, sollevare gentilmente il catetere partendo dal connettore hub. Maneggiare sempre il catetere con cura durante la procedura. La performance del prodotto può essere influenzata dalla manovra di cura durante l'apertura della confezione o durante la preparazione del prodotto.
- Per evitare il danneggiamento del catetere o del vaso sanguigno, introdurre, avanzare e far scorrere il catetere su di un filo guida precedentemente posizionato all'interno del catetere stesso attraverso un introduttore.
- Durante l'inserimento di un catetere con punta pigtail su di un filo guida posizionato nel paziente, raddrizzare attentamente il pigtail esclusivamente con l'ausilio di un raddrizzatore per evitare danni alla punta. Non raddrizzare manualmente.
- Prestare la massima cura per evitare danni al vaso da cui passa il catetere. Il catetere potrebbe occludere i vasi minori. E' necessario prestare molta attenzione per evitare una completa ostruzione del flusso sanguigno.
- L'avanzamento, la manipolazione e la rimozione del catetere devono sempre essere eseguiti con guida fluoroscopica.
- Qualora la base del catetere si piegasse severamente, rimuovere l'intero sistema (catetere angiografico, filo guida e introduttore). Un'eccessiva sollecitazione potrebbe danneggiare il catetere, provocandone la possibile rottura.
- Qualora si riscontrasse una forte resistenza durante la manipolazione, interrompere la procedura e determinare la causa della resistenza prima di continuare. In caso non sia possibile determinare la causa della resistenza, rimuovere il catetere. E' possibile anche considerare la rimozione simultanea di tutti i dispositivi utilizzati.
- La rimozione del catetere dalla vascolatura e/o la rimozione del filo guida dal lumen del catetere deve essere effettuata con la massima cura.

Complicazioni
L'utilizzo di questo prodotto durante una procedura clinica dovrebbe essere ristretto a quei medici che abbiano ricevuto una preparazione adeguata e che siano a conoscenza delle potenziali complicazioni, che possono occorrere sia durante che dopo la procedura.
Possibili complicazioni comprendono, ma non sono limitate a:
- aritmia
- sanguinamenti
- morte
- embolia (aerea)
- ematoma al punto di entrata
- emorragia
- infezione
- ischemia miocardica e/o infarto miocardico
- deficit neurologico che include attacco ischemico transitorio / colpo apoplettico
- migrazione di placca
- pseudoaneurisma
- formazione di trombo
- trauma vascolare, inclusa dissezione, perforazione e/ o rottura
- occlusione vascolare
- spasmo vascolare

Suggerimenti per l'uso
- Estrarre attentamente il catetere dalla confezione.
- Sciacquare il catetere con soluzione salina eparinizzata sterile.
- Introdurre il catetere nella vascolatura su di un filo guida introduttore utilizzando una tecnica di entrata percutanea a scelta e avanzare delicatamente il catetere fino alla posizione desiderata sotto controllo fluoroscopico.
- Dopo avere rimosso il filo guida, è possibile eseguire l'angiografia.
- Per rimuovere il catetere si raccomanda di reinserire il filo guida. Estrarre attentamente il catetere sotto controllo fluoroscopico.

Garanzia e Limitazione di responsabilità
PendraCare International B.V. garantisce che i suoi prodotti sono stati fabbricati con la massima attenzione.
Non vi è garanzia espressa o implicita, compresa senza alcuna limitazione qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, applicabile sul prodotto PendraCare descritto nella presente pubblicazione. In nessuna circostanza PendraCare sarà ritenuta responsabile per danni diretti, incidentali o conseguenti diversamente da quanto espressamente previsto dalla legge in materia. Nessun individuo dispone dell'autorità di legare PendraCare a qualsiasi rappresentanza o garanzia ad eccezione di quanto specificamente stabilito qui di seguito.

Le specifiche descrizioni stampate da PendraCare, la presente pubblicazione inclusa, descrivono il prodotto in generale al momento della produzione e non sono da intendersi come espressa garanzia.

PendraCare International B.V. non si riterrà responsabile per danni diretti, incidentali o conseguenti associati al riutilizzo del catetere.

ITALIANO

Istruzioni per l'uso
Catetere angiografico

Contenuto:
Catetere angiografico

Descrizione dispositivo
Il Catetere Angiografico è un catetere intravascolare intrecciato destinato per l'inserimento di un mezzo di contrasto all'interno di vasi sanguigni predisposti nel corso di una procedura angiografica al fine di facilitare la visualizzazione del sistema vascolare di un'area predefinita. I cateteri angiografici sono disponibili in vari diametri e lunghezze, e con punte di diverse configurazioni. Per dettagli relativi a dimensioni del catetere, forma della punta, compatibilità del filo guida e pressione di iniezione massima fare riferimento alle etichette del prodotto.

Indicazioni
I cateteri angiografici sono designati per il rilascio di un mezzo di contrasto radiopaco in determinate aree del sistema vascolare.

Controindicazioni
Nessuna controindicazione conosciuta.

Avvertenze
- Fare riferimento alla legenda simboli delle Istruzioni per l'Uso.
- Utilizzare entro la data di scadenza come indicato sull'etichetta.
- I cateteri sono forniti in una condizione non pirogena e sterile tramite procedimento con ossido di etilene (EO). Non utilizzare il prodotto se la barriera sterile e/o la confezione dovessero risultare aperte o danneggiate.
- I cateteri sono designati esclusivamente per uso singolo. Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare. Il riutilizzo, il ritrattamento o la risterilizzazione possono compromettere l'integrità strutturale del catetere e/o provocare danni ai dispositivo, e conseguentemente causare lesioni personali, malattia o morte del paziente. I cateteri sono estremamente difficili da pulire dopo l'esposizione a materiali biologici. Il riutilizzo, il ritrattamento o la risterilizzazione possono causa vez retirado el catéter guía, podrá realizar la angiografía.
- Antes e durante l'uso, lavare il catetere con una soluzione salina eparinizzata sterile per evitare o ridurre il coagulazione do sangue e o aeroembolismo. Deverá ter-se em consideração a heparinização sistémica. No caso de uso múltiplo no mesmo procedimento, certifique-se de que o catéter está lavado e limpo por fora.
- Não expor a solventes orgânicos.
- Não exceda a pressão de injecção máxima ind

ČEŠTINA

Návod k použití
Angiografický katétr

Obsah:
Angiografický katétr

Popis zařízení

Angiografický katétr je opleteným nitrocévním katétrem navrženým k aplikaci kontrastní látky do vybraných krevních cév při provádění angiografické procedury a usnadňujícím vizualizaci cévního systému cílové oblasti. Angiografické katétry jsou dostupné s různými průměry a délkami a s různými konfiguracemi hrotu konovky. Podrobnější informace o rozměrech katétru, hrotu konovky, hydrofilní vodicího drátu a maximálním tlaku vstřikování jsou uvedeny na štítcích výrobků.

Indikace

Angiografické katétry jsou navrženy k aplikaci RTG neprůsvitné kontrastní látky pro výběr míst v cévním systému.

Kontraindikace

Žádné nejsou známy.

Výstrahy

- Víc kapitola pojednávající o symbolech v tomto návodu.
- Nepoužívejte tento výrobek po datu „použitelnost" uvedeném na štítku.
- Katétry se dodávají nepyrogenní a sterilní. Sterilizace byla provedena pomocí ethylenoxidu (EO). Nepoužívejte katétr, pokud jsou sterilní bariéra anebo obal poražený.
- Katétry jsou určeny k použití pouze během jedné procedury . Nepoužívejte, neobalujte ani nesterilizujte opakovaně. Další použití, ošetření nebo sterilizace by mohly narušit strukturní celistvost katétru anebo původní jeho funkčnost, což by mohlo vést k poranění, onemocnění nebo i úmrtí pacienta. Katétry, které se již dostaly do styku s biologickým materiálem, se čistí mírnořádná očištění. Opakované použití, ošetření nebo sterilizace mohou vyvolat nebezpečí kontaminace katétru a případně přivodit pacientovi infekci nebo přenos infekce, například přenos infekční nemoci (nemoci) z jednoho pacienta na druhého. Kontaminace katétru může způsobit poranění, onemocnění nebo úmrtí pacienta.
- Před použitím katétr prohlédněte a zkontrolujte, zda svou velikostí, tvarem a stavem odpovídá určité proceduře. Nepoužívejte poškozené katétry.
- Před použitím a během používání propláchněte katétr sterilním heparinizovaným fyziologickým roztokem, aby se zabránilo nebo snížilo srážení krve a nedošlo ke vzduchové embolii. Zvažte provedení systemické heparinizace. V případě několikanásobného použití v rámci stejné procedury zajistěte, aby katétr byl opláchnut a očištěn z vnější strany.
- Nevystavujte výrobek organickým rozpouštědlům.
- Nepřekračujte maximální tlak vstřikování uvedený na štítku.
- Použitý katétr může představovat biologické nebezpečí. Při manipulaci s katétrem a obalem a jeho likvidaci po použití je třeba dodržovat platné zákony a předpisy a řídit se odpovídajícím postupy.

Bezpečnostní opatření

- Indikace, kontraindikace a použití katétru musí být provedeny lékařem, který je seznámen s možnými komplikacemi a nežádoucími účinky spojenými s angiografickými procedurami. Dostojte se cévnímu anatomickému a fyziologickému rozdílům v závislosti na věkové skupině.
- Při zvládání katétru se vyhněte zachycení a nejvyšší opatrnosti. Nedbalým zacházením při vybalování nebo přípravě by se mohla narušit funkčnost výrobku.
- Aby se katétr nepoškodil a nedošlo k poškození cévy, zaveďte, posouvejte a vysouvejte katétr zavaděčem pouzdra katétru po předem zavedeném vodicím drátu.
- Při zavádění katétru se upínací svěrka vodicího drátu, který je zaveden do pacienta, musí být koncovka tohoto spirálového přívodu (pigtail) opatrně naplněna pouze pomocí naplňovadla koncovky, jinak může dojít k poškození této koncovky. Neprovádějte naplňování ručně.
- Postupujte s největší opatrností, aby při průchodu katétru nedošlo k poškození krevního řečiště. Menší cévy může katétr uzpět. Je třeba dbát, aby nedošlo k úplné neprůchodnosti a nezastavil se tok krve.
- Katétr je vždy třeba zasouvat, vysouvat a manipulovat s ním za fluoroskopické kontroly.
- Pokud se tubus katétru podstatně zkroutí, celou sestavu (angiografický katétr, vodicí drát i zavaděč pouzdra katétru) vytáhněte. Přitěsným kroucením by se mohl katétr poškodit a nakonec i zlomit.
- Zacházejte s katétrem opatrně, abyste zabránili jeho ohýbání a poškození. Nepoužívejte ostré nástroje, například nůžky nebo skalpel, k otevření obalu.
- Nepoužívejte katétr, pokud byl upuštěn nebo s ním bylo jakýmkoli způsobem manipulováno, například pokud byl ohnutý, zlomený nebo jeho součásti nejsou správně připevněny.
- Nepoužívejte katétr, pokud byl vystaven nadměrné teplotě